




Monats-Checkliste März



- ◆ **intensive Kontrolle** des Volkes bei moderaten Temperaturen




- ◆ **Leere und bekotete** Waben entnehmen und durch helle Leerwaben/ Mittelwände ersetzen.
- ◆ **Futter- und Leerwaben** an, nicht in (!) das Brutnest setzen, damit das Volk sich problemlos ausbreiten kann.



- ◆ **Brutnest** kontrollieren: Stifte und verdeckelte Brut bereits vorhanden?
- ◆ **Weiselrichtiges** Volk?
- ◆ Hinweise auf **Fehlentwicklungen**?
- ◆ Ausreichende **Futtermengen**?
- ◆ **Drohnen-Baurahmen** nahe an das Brutnest setzen (bei starken Völkern)!



- ◆ **Mäusegitter** unbedingt entfernen! Sonst geht hier viel frisch gesammelter Pollen verloren.




- ◆ **Varroa-Windel** in den Boden schieben: Erleichtert das Beheizen der Beute durch die Bienen.



- ◆ **Diagnose** – natürlichen Milbenfall zum Zeitpunkt der (Sal-)Weidenblüte messen: >5 Milben pro Tag -> unbedingt Drohnenbrut-Schneiden vorbereiten: Baurahmen geben!




- ◆ Bei **Kälte** Bedenken wegen **Futtermenge**? Beute kurz ankippen: Zu leicht? Dann Futterwaben zuhängen (besser als Fütterung).



- ◆ **Schwaches** (gesundes!) Volk „Huckepack“ auf eine starkes Volk setzen – das Absperrgitter trennt die beiden Königinnen. Beide Völker nach einigen Wochen, vor (!) Beginn der Schwarmstimmung trennen!

→ Tausch des Platzes mit einem starken Volk; die Flugbienen verstärken das schwache Volk.



- ◆ **Völker** eines Standes **ausgleichen**, um einheitliche Volksstärke herzustellen: Brutwaben „umhängen“.