






Monats-Checkliste Oktober




- **Mittelwände und Leerwaben entnehmen**, denn sie werden nicht mehr benötigt. Das gilt auch für **Drohenrahmen!**



- **Varroa-Diagnose** alle 3-4 Wochen: Fallzahlen siehe Checkliste SEPTEMBER. Bei hoher Varroa-Belastung die Brut entnehmen und die Restentmilbung vorziehen.



- **Behandlung in brutfreien Völkern:** Oxalsäure oder Milchsäure. In Völkern mit verdickter Brut NUR mit Ameisensäure (Wetter beachten) oder vorher die Brut entnehmen. Bestandsbuch!




- **Varroa-Windel herausziehen:** ruhigerer Wintersitz der Bienen, Beendigung der Brutphase und Schutz vor Staunässe (Schimmelbildung).




- **(Gesunde) Schwächlinge vereinigen:**
 - Schwächling entweisel (falls möglich)
 - direkt auf anderes Volk setzen, ohne Zeitungspapier



- **Probleme mit der Asiatischen Hornisse (*Vespa velutina*):** → siehe Checkliste SEPTEMBER.



- **Außentemperaturen beobachten:** Nach den ersten Frostnächten die **Winterbehandlung terminieren:** 3 Wochen später!



- **Sturmsicherung der Beuten (Gurte)**



- **Futterkranzproben nehmen (lassen):** AFB-Untersuchung/ Vorbeugung und für Gesundheitsbescheinigungen zur Wanderung oder zum Bienenverkauf.

(c) Dr. Friedrich Pohl, Bremen 2026